

Jamaica (AR 14-0334).

Rana sorta krumpira tradicionalnog tipa, namijenjena tržištu svježeg krumpira, s atraktivnom pokožicom i dobrom krupnoćom gomolja.




Maloprodaja
Svježe



Tradicionalni

- ▶ **Dobar prinos**
- ▶ **Atraktivna i kvalitetna pokožica**
- ▶ **Dobra krupnoća gomolja**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: OS 07-0020 x SAVIOLA
Pravo uzgajivača: U tijeku
Sadnica: AR 14-0334

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani / 7,5
Svjetla boja izdanaka: - / -
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: iznad prosjeka / 5
Lišće - početni razvoj: brz / 8
Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5
Lišće čvrstoća: prosjek / 6,5
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: svijetlo žuta / 6,5
Završna obrada kože: dobro / 7
Oblik gomolja: ovalno dugi / OL
Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7
Teberizacija: prosječna / 6
Veličina gomolja: velika / 8
Pravilnost veličine: pravilan / 7
Dormantnost: prilično kratko / 5,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo do nimalo osjetljiv / 8
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5
Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6
Metribuzin - prije nicanja: jako osjetljivo / 3
Metribuzin - prije nicanja: jako osjetljivo / 3
Bentazon: - / -
Etilen: - / -
Podvodna težina: 332
Sadržaj suhe tvari: 18,3%
Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB
Siva promjena boje (nakon kuhanja): - / -
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: - / -
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: - / -
Razina TGA: 15

Preporuke za uzgoj


agricopotatoes.ba

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet. Po mogućnosti kao podijeljena primjena, drugo tretiranje ubrzo nakon tuberizacije.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Preporuča se kratki toplinski šok ili pravilno prethodno nicanje.

Razmak sadnje

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja nemojte koristiti metribuzin (Sencor), jer uzrokuje jaku reakciju lišća i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 6

Prskanje: malo osjetljivo / 6,5

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 3,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6

Fusarium: - / -

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Krasta u prahu: - / -

Crna točka: - / -

Bolest bradavica F1: otporno* / 10*

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: osjetljiv* / 1*

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -