

Sevas (KO 13-2242).



Tradicionalni

Rana sorta za glavni usjev, s krupnim ovalnim gomoljima, dobrim mirovanjem i dobrom tolerantnošću na mehanička oštećenja.

- ▶ **Visok prinos**
- ▶ **Dobra otpornost na virusne bolesti i običnu krastavost**
- ▶ **Atraktivna i kvalitetna pokožica**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Konst Research B.V.
Križanje: KO 06-1457 x SAVANNA
Pravo uzgajivača: U tijeku
Sadnica: KO 13-2242

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 5,5
Svjetla boja izdanaka: - / -
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: prosjek / 6
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Lišće - konačni razvoj: dobro / 8
Lišće čvrstoća: čvrst / 8
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: svijetlo žuta / 6
Završna obrada kože: iznad prosjeka / 6,5
Oblik gomolja: ovalan / O
Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5
Teberizacija: prilično niska / 5,5
Veličina gomolja: velika / 8
Pravilnost veličine: pravilan / 7
Dormantnost: prilično dugo / 7,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo do nimalo osjetljiv / 8
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5
Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6,5
Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7
Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5
Bentazon: - / -
Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7
Podvodna težina: 350
Sadržaj suhe tvari: 19,2%
Vrsta kuhanja: čvrst / A
Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: prosjek / 6
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: - / -
Razina TGA: 7,4


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet - 10%. Po mogućnosti kao podijeljena primjena, drugo tretiranje ubrzo nakon tuberizacije.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Isključivanje više od dva puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) ne uzrokuje reakciju lišća niti smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za srednje skladištenje.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo osjetljivo / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: - / -

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: malo osjetljivo / 6,5

Krasta u prahu: - / -

Crna točka: - / -

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -



Sjemenarna • Fra Didaka Buntića 160 A • Široki Brijeg • BiH ☎ +387 39 700 000

✉ info@sjemenarna.com 🌐 www.agricopotatoes.ba



SJEMENARNA