

Agria.

Glavni usjev, sorta za preradu sa žutim mesom, dobrog prinosa i vrlo postojanog kvaliteta.



Organsko
Organski



Prerada
Pomfrit
Čips
Pogodnost



Maloprodaja
Svježe



Tradicionalni

- » Izvrsna kvaliteta za prženje
- » Otporan na više tipova virusa
- » Dobro skladištenje



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Böhm

Križanje: QUARTA x SEMLO

Pravo uzgajivača: Istekao

Sadnica: BM 77-0945

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: glavni usjev / 5

Svijetla boja izdanaka: tamno plava / BV

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: nikakav / 8

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: dobro / 8

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: žuta / 7

Završna obrada kože: prosječno / 6

Oblik gomolja: ovalno dugi / OL

Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7

Teberizacija: prilično niska / 5

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: pravilan / 7

Dormantnost: dugo / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6

Crna mrlja (unutarnja modrica): dosta osjetljiv / 6

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5

Šteta u žetvi: osjetljiv / 5

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Bentazon: prilično osjetljivo / 6,5

Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6

Podvodna težina: 402

Sadržaj suhe tvari: 21,8%

Vrsta kuhanja: brašnat / BC

Siva promjena boje (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7

Sirova promjena boje: malo osjetljiv / 7

Kvaliteta prženja: izvrsno / 8

Raspodjela suhe tvari: prosjek / 6,5

Kvaliteta hrskavosti: dobro / 7

Razina TGA: 2,7


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet - 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 10%.

Tretiranje sjemena

Preporuča se kratki toplinski šok ili pravilno prethodno nicanje. Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 biljaka/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća, ali rijetko bilo kakvo smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugoročno skladištenje.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: malo osjetljivo / 6

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: malo osjetljivo / 7

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 7

Fusarium: malo osjetljivo / 6,5

Obična krasta: vrlo osjetljivo / 4,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: vrlo osjetljivo / 3

Crna točka: - / -

Bolest bradavica F1: malo osjetljivo / 9

Bolest bradavica F6: dosta osjetljivo / 6

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: osjetljiv / 2

Bijela nematoda Pa 3: osjetljiv / 2