

Arizona.



Tradicionalni

Srednje rana sorta koja daje visoke prinose u različitim klimatskim uvjetima.

- ▶ Ujednačen oblik i veličina gomolja
- ▶ Dobro podnosi sušu
- ▶ Otporan na više tipova virusa



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
 Križanje: UK 150-19D22 x MASCOTTE
 Pravo uzgajivača: 31-12-2040
 Sadnica: AR 98-0313

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: srednje rani / 7
 Svijetla boja izdanaka: tamno crvena / RV
 Boja cvijeta: bijela / W
 Broj bobica: iznad prosjeka / 5
 Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7
 Lišće - konačni razvoj: dobro / 8
 Lišće čvrstoća: prosjek / 6
 Boja kože: žuta / Y
 Boja mesa: svijetlo žuta / 6
 Završna obrada kože: iznad prosjeka / 6,5
 Oblik gomolja: ovalan / O
 Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7,5
 Teberizacija: prosječna / 6
 Veličina gomolja: velika / 8
 Pravilnost veličine: pravilan / 7
 Dormantnost: prosječno / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
 Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7
 Pukotine rasta: malo osjetljiv / 7
 Šteta u žetvi: malo osjetljiv / 7
 Metribuzin - prije nicanja: osjetljivo / 5
 Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5
 Bentazon: malo osjetljivo / 7
 Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7
 Podvodna težina: 301
 Sadržaj suhe tvari: 17%
 Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB
 Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6,5
 Sirova promjena boje: - / -
 Kvaliteta prženja: neprikladan / 4
 Raspodjela suhe tvari: - / -
 Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4
 Razina TGA: 4,2


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet - 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Isključivanje više puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća i određeno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za srednje skladištenje.

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo do nimalo osjetljivo / 8

Prskanje: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - gomolj: osjetljivo / 5

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: vrlo osjetljivo / 2

Crna točka: vrlo osjetljivo / 4

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: dosta osjetljivo / 6

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -