

Artemis.

Druga rana konzumna sorta s izvrsnim prinosom i savršena za domaći krumpirići.



Maloprodaja
Svježe



Tradicionalni

- ▶ Izvrsna kvaliteta pri prženju
- ▶ Dobra tolerancija na nagnječenja
- ▶ Višestruka otpornost



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: Rianta x Renska
Pravo uzgajivača: 31-12-2029
Sadnica: AR 87-0039

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: srednje rani / 7
Svjetla boja izdanaka: zelena / G
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Lišće - konačni razvoj: prosječno / 7
Lišće čvrstoća: prosjek / 6
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: svijetlo žuta / 6
Završna obrada kože: dobro / 7
Oblik gomolja: ovalno dugi / OL
Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7
Teberizacija: prilično visoka / 7
Veličina gomolja: prilično veliko / 7
Pravilnost veličine: pravilan / 7
Dormantnost: prilično kratko / 5,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo do nimalo osjetljiv / 8
Pukotine rasta: malo osjetljiv / 7
Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6,5
Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6
Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6
Bentazon: - / -
Etilen: - / -
Podvodna težina: 375
Sadržaj suhe tvari: 20,4%
Vrsta kuhanja: prilično brašnat / B
Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: prosjek / 6
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: prosjek / 6
Razina TGA: 4,9


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet + 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Poželjno je posaditi gomolje u toplo tlo, jer je početni razvoj ove sorte spor. Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima.

Razmak sadnje

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća i određeno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za srednje skladištenje.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: malo osjetljivo / 7

Virus - Yn: malo osjetljivo / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): malo do nimalo osjetljivo / 8

Prskanje: malo osjetljivo / 6

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - gomolj: malo do nimalo osjetljivo / 8

Fusarium: osjetljivo / 5

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: osjetljivo / 5,5

Crna točka: malo osjetljivo / 7

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -