

# Babylon.

Glavni usjev, sorta za preradu sa žutim mesom, dobrog prinosa i vrlo postojanog kvaliteta.



**Prerada**  
Pomfrit  
Pogodnost



**Maloprodaja**  
Svježe



**Tradicionalni**

- » Izvrsna kvaliteta za prženje
- » Otporan na više tipova virusa
- » Dobro skladištenje



## Karakteristike

### Opće karakteristike

Uzgajivač: R.K. Bakker

Križanje: AGRIA MUTANT

Pravo uzgajivača: 31-12-2046

Sadnica: BA 06-0001

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: glavni usjev / 5

Svijetla boja izdanaka: tamno plava / BV

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: nikakav / 8

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: dobro / 8

Lišće čvrstoća: čvrst / 8

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: žuta / 7

Završna obrada kože: prosječno / 6

Oblik gomolja: ovalno dugi / OL

Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7

Teberizacija: prosječna / 6

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: pravilan / 7

Dormantnost: dugo / 8

### Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6

Crna mrlja (unutarnja modrica): dosta osjetljiv / 6

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6

Šteta u žetvi: osjetljiv / 5,5

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Bentazon: malo osjetljivo / 7,5

Etilen: od 5% manje gomolja do 5% više gomolja / 5

Podvodna težina: 401

Sadržaj suhe tvari: 21,7%

Vrsta kuhanja: brašnat / BC

Siva promjena boje (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7

Sirova promjena boje: malo osjetljiv / 7

Kvaliteta prženja: izvrsno / 8

Raspodjela suhe tvari: dobro / 7

Kvaliteta hrskavosti: dobro / 7

Razina TGA: 5,2


[agricopotatoes.ba](http://agricopotatoes.ba)

# Preporuke za uzgoj

## Gnojidba i tretiranje sjemena <sup>1</sup>

Dušik: standardni savjet - 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 10%.

## Tretiranje sjemena

Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (44.000 plants/ha)

50/55 mm: 38 cm (35.000 plants/ha)

<sup>1</sup> Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

## Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća i određeno smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

## Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

## Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugoročno skladištenje.



## Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo osjetljivo / 7,5

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: malo osjetljivo / 6,5

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6,5

Fusarium: malo osjetljivo / 7

Obična krasta: osjetljivo / 5

Say potato,  
say Agrico.

Krasta u prahu: - / -

Crna točka: vrlo osjetljivo / 4,5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan na polje / 8

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -