

Esmee.

Visokoprinosna crvena srednje rana sorta, ujednačenih gomolja, jako dobrih kulinarski osobina.




Maloprodaja
Svježe



Tradicionalni

- » **Lijep izgled**
- » **Krupni gomolji**
- » **Otporan na više tipova virusa**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.

Križanje: LAURA x RODEO

Pravo uzgajivača: 31-12-2043

Sadnica: AR 01-0410

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: srednje rani / 6,5

Svijetla boja izdanaka: tamno crvena / RV

Boja cvijeta: svijetlo ljubičasta / LP

Broj bobica: vrlo visok / 4

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7

Boja kože: crvena / R

Boja mesa: žuta / 7

Završna obrada kože: izvrsno / 8

Oblik gomolja: ovalno dugi / OL

Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5

Teberizacija: prosječna / 6

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: pravilan / 7

Dormantnost: prosječno / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5

Crna mrlja (unutarnja modrica): malo do nimalo osjetljiv / 8

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6

Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6,5

Metribuzin - prije nicanja: jako osjetljivo / 4

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7

Bentazon: malo osjetljivo / 7

Etilen: od 5% manje gomolja do 5% više gomolja / 5

Podvodna težina: 326

Sadržaj suhe tvari: 18%

Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB

Siva promjena boje (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5

Sirova promjena boje: dosta osjetljiv / 6

Kvaliteta prženja: prosjek / 6

Raspodjela suhe tvari: - / -

Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4

Razina TGA: 8,2

Preporuke za uzgoj


agricopotatoes.ba

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet + 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka. Isključivanje može imati negativan utjecaj na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Nakon nicanja nemojte koristiti metribuzin (Sencor), jer uzrokuje jaku reakciju lišća i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Prikladno za srednje skladištenje.

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 7

Fusarium: malo osjetljivo / 7

Obična krasta: malo osjetljivo / 6

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 6,5

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -