
PREPORUKA ZA UZGOJ

Evolution.

Druga rana sorta s atraktivnom tamnocrvenom pokožicom i ranim dobrim urodom.

Tradicionalni



- **Krupni gomolji**
- **Dobro podnosi sušu**
- **Otporan na više tipova krumpirove cistolike nematode**

Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: AR 94-0807 x AMOROSA
Pravo uzgajivača: 31-12-2042
Sadnica: AR 99-0522

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: srednje rani / 6,5
Svijetla boja izdanaka: crvenozelena / GR
Boja cvijeta: svijetlo ljubičasta / LP
Broj bobica: iznad prosjeka / 5
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Lišće - konačni razvoj: dobro / 8
Lišće čvrstoća: prosjek / 6,5
Boja kože: crvena / R
Boja mesa: svijetlo žuta / 6
Završna obrada kože: dobro / 7
Oblik gomolja: ovalno dugi / OL
Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6
Teberizacija: prilično visoka / 7
Veličina gomolja: velika / 8
Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: kratko / 4

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6
Šteta u žetvi: malo osjetljiv / 7
Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7
Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5
Bentazon: malo osjetljivo / 7
Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
Podvodna težina: 343
Sadržaj suhe tvari: 18,9%
Vrsta kuhanja: prilično brašnast / B
Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: neprikladan / 4,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4
Razina TGA: 8

AGRICO

Ni u kojem slučaju Agrico neće biti odgovoran za štete nastale ili povezane s informacijama sadržanim u ovom opisu.

SJEMENARNA

PREPORUKA ZA UZGOJ

Preporuke za uzgoj

agricopotatoes.ba

Gnojidba i tretiranje sjemena [1]

Dušik: standardni savjet - 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka.Isklijavanje više puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

[1] Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća, alli rijetko bilo kakvo smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: osjetljivo / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: malo osjetljivo / 6

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 6,5

Crna točka: malo osjetljivo / 6

Bolest bradavica F1: umjereno osjetljivo / 8

Bolest bradavica F6: otporno / 10

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: umjereno osjetljiv / 6

Bijela nematoda Pa 2: otporan na polje / 7

Bijela nematoda Pa 3: umjereno osjetljiv / 5

AGRICO

Sjemenarna • Fra Didaka Buntića 160 A • Široki Brijeg • BiH +387 39 700 000

info@sjemenarna.com www.agricopotatoes.ba

SJEMENARNA