

Kuroda.



Tradicionalni

Rani glavni usjev, konjušna sorta s crvenom pokožicom, izvrsnim podnošenjem topline i vrlo dobrim urodom.

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Dobro skladištenje**
- ▶ **Otpornost na višetiopova bradavičaste bolesti krumpira**



characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: G. Kuik

Križanje: AR 76-199-03 x KO 80-1407

Pravo uzgajivača: 31-12-2025

Sadnica: KK 83-0216

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 6

Svijetla boja izdanaka: tamno plava / BV

Boja cvijeta: ljubičasta / P

Broj bobica: prosjek / 6

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: dobro / 8

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7,5

Boja kože: crvena / R

Boja mesa: svijetlo žuta / 6

Završna obrada kože: dobro / 7

Oblik gomolja: ovalan / O

Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5

Teberizacija: prilično niska / 5

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: pravilan / 7

Dormantnost: dugo / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7

Crna mrlja (unutarnja modrica): dosta osjetljiv / 6

Pukotine rasta: malo osjetljiv / 7

Šteta u žetvi: osjetljiv / 5

Metribuzin - prije nicanja: osjetljivo / 5

Metribuzin - prije nicanja: osjetljivo / 5

Bentazon: - / -

Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7

Podvodna težina: 426

Sadržaj suhe tvari: 23%

Vrsta kuhanja: brašnat / BC

Siva promjena boje (nakon kuhanja): vrlo osjetljiv / 4,5

Sirova promjena boje: - / -

Kvaliteta prženja: ispod prosjeka / 5,5

Raspodjela suhe tvari: - / -

Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 5

Razina TGA: -


agricopotatoes.ba

How to grow

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet + 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 20%.

Tretiranje sjemena

Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima. Jednokratno isključivanje nije obavezno.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

Korov

Nakon nicanja nemojte koristiti metribuzin (Sencor), jer uzrokuje jaku reakciju lišća i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Prikladno za dugoročno skladištenje.

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: malo osjetljivo / 6

Virus - Yn: malo osjetljivo / 7

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: malo osjetljivo / 7

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - gomolj: osjetljivo / 5

Fusarium: malo do nimalo osjetljivo / 8

Obična krasta: osjetljivo / 5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: vrlo osjetljivo / 2

Crna točka: - / -

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: malo osjetljivo / 9

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -