

Lugano.

Rana sorta za preradu žutog mesa glavnog usjeva s dobrom otpornošću na krumpirove cistolike nematode.



Prerada
Pomfrit



Tradicionalni

- » **Krupni gomolji**
- » **Jako dobra otpornost**
- » **Dobro skladištenje**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: F.J. Vos

Križanje: AR 00-2211 x AR 99-0669

Pravo uzgajivača: 31-12-2048

Sadnica: VO 07-0289

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 5,5

Svijetla boja izdanaka: crvena / R

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: ispod prosjeka / 7

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: dobro / 8

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7,5

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: svijetlo žuta / 6,5

Završna obrada kože: prosječno / 6

Oblik gomolja: ovalno dugi / OL

Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6

Teberizacija: prilično niska / 5

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: pravilan / 7

Dormantnost: dugo / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6

Crna mrlja (unutarnja modrica): dosta osjetljiv / 6

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5

Šteta u žetvi: vrlo osjetljiv / 4,5

Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Bentazon: malo do nimalo osjetljivo / 8

Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6

Podvodna težina: 394

Sadržaj suhe tvari: 21,4%

Vrsta kuhanja: prilično brašnat / B

Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6,5

Sirova promjena boje: dosta osjetljiv / 6

Kvaliteta prženja: dobro / 7

Raspodjela suhe tvari: dobro / 7,5

Kvaliteta hrskavosti: ispod prosjeka / 5,5

Razina TGA: 6,4


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 20%.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka. Isklijavanje više od dva puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 36 cm (37.000 biljaka/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) ne uzrokuje reakciju lišća niti smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugoročno skladištenje.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: osjetljivo / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7,5

Prskanje: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - gomolj: osjetljivo / 5,5

Fusarium: malo osjetljivo / 6,5

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 7,5

Crna točka: malo osjetljivo / 6

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: malo osjetljivo / 9

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otporan / 9

Bijela nematoda Pa 2: otporan / 9

Bijela nematoda Pa 3: otporan / 9