

Riviera.



Tradicionalni

Prva rana sorta s lijepom kožicom, izvrsnom otpornošću na toplinu, dobrom otpornošću na viruse i ranim dobrim prinosom.

- **Krupni gomolji**
- **Lijep izgled**
- **Dobra otpornost na viruse**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Mts. Boerhave
Križanje: MINERVA x ALCMARIA
Pravo uzgajivača: 31-12-2030
Sadnica: BH 86-0266

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: najranije / 8
Svjetla boja izdanaka: tamno plava / BV
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7
Lišće - konačni razvoj: prosječno / 7
Lišće čvrstoća: prosjek / 6,5
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: svijetlo žuta / 6
Završna obrada kože: izvrsno / 8
Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR
Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6
Teberizacija: prilično niska / 5
Veličina gomolja: prilično veliko / 7,5
Pravilnost veličine: pravilan / 7
Dormantnost: prosječno / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo do nimalo osjetljiv / 8
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5
Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6
Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8
Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8
Bentazon: - / -
Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
Podvodna težina: 318
Sadržaj suhe tvari: 17,7%
Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB
Siva promjena boje (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: neprikladan / 4,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4
Razina TGA: 4,8


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet + 10%.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima. Isklijavanje više puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) ne uzrokuje reakciju lišća niti smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: malo osjetljivo / 7

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 3

Kasna mrlja - gomolj: osjetljivo / 5

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: vrlo osjetljivo / 2

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -