

Rudolph.



Tradicionalni

Crvena kasna sorta, bijelog mesa, odličnih kulinarskih osobina, sorta pogodna za dugo skladištenje.

- » **Bijela boja mesa**
- » **Krupni gomolji**
- » **Dobro skladištenje**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
 Križanje: CHIEFTAIN x STIRLING
 Pravo uzgajivača: 31-12-2035
 Sadnica: UK 93-1-2

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 5,5
 Svijetla boja izdanaka: tamno crvena / RV
 Boja cvijeta: svijetlo ljubičasta / LP
 Broj bobica: prosjek / 6
 Lišće - početni razvoj: prosjek / 6
 Lišće - konačni razvoj: dobro / 8
 Lišće čvrstoća: čvrst / 8
 Boja kože: crvena / R
 Boja mesa: bijela / 4
 Završna obrada kože: dobro / 7
 Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR
 Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6
 Teberizacija: prilično niska / 5
 Veličina gomolja: velika / 8
 Pravilnost veličine: pravilan / 7
 Dormantnost: prilično dugo / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
 Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7
 Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6
 Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6
 Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8
 Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5
 Bentazon: - / -
 Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
 Podvodna težina: 376
 Sadržaj suhe tvari: 20,5%
 Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB
 Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6,5
 Sirova promjena boje: - / -
 Kvaliteta prženja: iznad prosjeka / 6,5
 Raspodjela suhe tvari: - / -
 Kvaliteta hrskavosti: ispod prosjeka / 5,5
 Razina TGA: 5,5


agricopotatoes.ba

Preporuke za uzgoj

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet + 5%. Po mogućnosti kao podijeljena primjena, drugo tretiranje ubrzo nakon tuberizacije.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 10%.

Tretiranje sjemena

Preporuča se kratki toplinski šok ili pravilno prethodno nicanje. Pravilno prethodno klijanje nakon skidanja gornje klice može dati pozitivan rezultat na zametnutim gomoljima. Jednokratno isključivanje nije obavezno.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća i određeno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugoročno skladištenje.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: osjetljivo / 5

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: malo osjetljivo / 7

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: osjetljivo / 5,5

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: osjetljivo / 5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 7

Crna točka: malo osjetljivo / 7

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: umjereno osjetljivo / 8

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -