

Spectra.

Srednje rana sorta, visokih prinosa i ujednačenih gomolja.


- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Dobra tuberizacija**
- ▶ **Ujednačen oblik i veličina gomolja**



Maloprodaja
Svježe



Tradicionalni



characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: Lantmännen Seed B.V.

Križanje: ARIELLE x SOFIA

Pravo uzgajivača: 31-12-2046

Sadnica: SW 05-1431

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: srednje rani / 7

Svijetla boja izdanaka: tamno crvena / RV

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: vrlo visok / 4

Lišće - početni razvoj: brz / 8

Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5

Lišće čvrstoća: prosjek / 6,5

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: svijetlo žuta / 6

Završna obrada kože: vrlo dobro / 7,5

Oblik gomolja: ovalno okrugli / OR

Pravilnost oblika gomolja: pravilan / 7,5

Teberizacija: prilično visoka / 7

Veličina gomolja: prilično veliko / 7,5

Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5

Dormantnost: prilično kratko / 5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5

Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7,5

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6

Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7

Metribuzin - prije nicanja: malo osjetljivo / 7,5

Bentazon: malo do nimalo osjetljivo / 8

Etilen: od 5% manje gomolja do 5% više gomolja / 5

Podvodna težina: 324

Sadržaj suhe tvari: 17,9%

Vrsta kuhanja: prilično čvrst / AB

Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6

Sirova promjena boje: vrlo osjetljiv / 4

Kvaliteta prženja: neprikladan / 4,5

Raspodjela suhe tvari: - / -

Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4

Razina TGA: 4,7


agricopotatoes.ba

How to grow

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka. Isključivanje može imati negativan utjecaj na pravilnost prinosa i veličine.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Posadite Spectru nešto dublje od ostalih sorti kako biste izbjegli zelene gomolje.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) može izazvati reakciju lišća i određeno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za srednje skladištenje.

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.



Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo osjetljivo / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7

Prskanje: osjetljivo / 5

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6

Fusarium: osjetljivo / 5,5

Obična krasta: osjetljivo / 5

Krasta u prahu: vrlo osjetljivo / 4

Crna točka: osjetljivo / 5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -