


Paradiso.



Tradicionalni

Rani glavni usjev, veliki rastući gomolji s izvrsnim prinosom za tradicionalno tržište.

- » Veliki gomolji
- » Lijep izgled
- » Dobra tolerancija protiv modrica



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: M. Pot & M. Klaver

Križanje: RODEO x VALOR

Pravo uzgajivača: 31-12-2048

Sadnica: PK 06-0108

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 6

Svijetla boja izdanaka: crvena / R

Boja cvijeta: ljubičasta / P

Broj bobica: ispod prosjeka / 6,5

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7,5

Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: svijetlo žuta / 6

Završna obrada kože: dobro / 7

Oblik gomolja: ovalno dugi / OL

Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5

Teberizacija: prosječna / 6

Veličina gomolja: velika / 8

Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5

Dormantnost: prosječno / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7

Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7,5

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5

Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6,5

Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8

Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5

Bentazon: prilično osjetljivo / 6,5

Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6

Podvodna težina: 329

Sadržaj suhe tvari: 18,2%

Vrsta kuhanja: prilično brašnat / B

Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6,5

Sirova promjena boje: - / -

Kvaliteta prženja: neprikladan / 4,5

Raspodjela suhe tvari: - / -

Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4

Razina TGA: 4,8


agricopotatoes.ba

Kako uzgojiti

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet - 20%. Po mogućnosti kao podijeljena primjena, drugo tretiranje ubrzo nakon tuberizacije.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Isključivanje može imati negativan utjecaj na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 23 cm (58.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) ne uzrokuje reakciju lišća niti smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za srednje skladištenje.

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.



Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo osjetljivo / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7,5

Prskanje: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6,5

Fusarium: osjetljivo / 5

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 7,5

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -