
PREPORUKA ZA UZGOJ

Paradiso.

Rani glavni usjev, veliki rastući gomolji s izvrsnim prinosom za tradicionalno tržište.

Tradicionalni

- **Veliki gomolji**
- **Lijep izgled**
- **Dobra tolerancija protiv modrica**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: M. Pot & M. Klaver
Križanje: RODEO x VALOR
Pravo uzgajivača: 31-12-2048
Sadnica: PK 06-0108

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 6
Svijetla boja izdanaka: crvena / R
Boja cvijeta: ljubičasta / P
Broj bobica: ispod prosjeka / 6,5
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7,5
Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5
Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: svijetlo žuta / 6
Završna obrada kože: dobro / 7
Oblik gomolja: ovalno dugi / OL
Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5
Teberizacija: prosječna / 6
Veličina gomolja: velika / 8
Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: prosječno / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7,5
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6,5
Šteta u žetvi: dosta osjetljiv / 6,5
Metribuzin - prije nicanja: malo do nimalo osjetljivo / 8
Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5
Bentazon: prilično osjetljivo / 6,5
Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
Podvodna težina: 329
Sadržaj suhe tvari: 18,2%
Vrsta kuhanja: prilično brašnast / B
Siva promjena boje (nakon kuhanja): dosta osjetljiv / 6,5
Sirova promjena boje: - / -
Kvaliteta prženja: neprikladan / 4,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Kvaliteta hrskavosti: neprikladan / 4
Razina TGA: 4,8

AGRICO

Ni u kojem slučaju Agrico neće biti odgovoran za štete nastale ili povezane s informacijama sadržanim u ovom opisu.

SJEMENARNA

PREPORUKA ZA UZGOJ

Preporuke za uzgoj

agricopotatoes.ba

Gnojidba i tretiranje sjemena [1]

Dušik: standardni savjet - 20%.Po mogućnosti kao podijeljena primjena, drugo tretiranje ubrzo nakon tuberizacije.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet.

Tretiranje sjemena

Isklijavanje može imati negativan utjecaj na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 23 cm (58.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 biljaka/ha)

[1] Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja, standardna uporaba metribuzina (Sencor) ne uzrokuje reakciju lišća niti smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporuča se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Prihod

Zbog njegovih rezultata osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenja žetve, pričekajte najmanje dva tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 4 °C. Prikladno za srednje skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo osjetljivo / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7,5

Prskanje: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - lišće: osjetljivo / 5,5

Kasna mrlja - gomolj: malo osjetljivo / 6,5

Fusarium: osjetljivo / 5

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 7,5

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: otporno / 10

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Bijela nematoda Pa 2: - / -

Bijela nematoda Pa 3: - / -

AGRICO

Sjemenarna • Fra Didaka Buntića 160 A • Široki Brijeg • BiH +387 39 700 000

info@sjemenarna.com www.agricopotatoes.ba

SJEMENARNA