ANBAUEMPFEHLUNG

Chester (AR 13-2694).

Eine frühe Kartoffel-Chipssorte mit Pallida-Resistenz, gleichmäßiger Knollengröße, gutem Trockenmassegehalt und guter Toleranz gegen Druckstellen und Rodebeschädigungen.

Verarbeitung
Chips
Flocken

- **Sehr ertragreiche Sorte mit hohen Knollenansatz**
- **Sehr gute Eignung für die Herstellung zu Pommes Frites auch nach Langzeitlagerung**
- **Früh Trockenmassegehalt**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: AR 07-4052 x ALICANTE
Setzling: AR 13-2694

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 6
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: - / -
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: rundoval / RO
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: durchschnittlich / 6,5
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: relativ kurz / 5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 446
Trockenmassegehalt: 24%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4,5
Pommes-frites-Qualität: - / -
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6
Chipsqualität: sehr gut / 7,5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 11,4 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

30/40 mm: 25-27 cm (51.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 30-32 cm (43.000 Pflanzen/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Für Verarbeitungszwecke nicht unter 9 °C lagern. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6
Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 8
Pfropfenbildung: anfällig / 5
Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: anfällig / 5,5
Fusarium: anfällig / 5
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: - / -
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: moderat anfällig / 5
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: moderat anfällig* / 5*
Weiße Nematoden Pa 2: teilweise resistent / 8
Weiße Nematoden Pa 3: teilweise resistent / 8

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de