

Jamaica (AR 14-0334).

Eine frühe Handelssorte mit guter Schalenoptik und Größe.




Einzelhandel
Frisch



Konventionell

- ▶ **Gute Erträge**
- ▶ **Gute Schalenoptik**
- ▶ **Gute Größe**



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.

Kreuzung: OS 07-0020 x SAVIOLA

Züchterrecht: Bevorstehend

Setzling: AR 14-0334

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: früh / 7,5

Lichtkeim: - / -

Blütenfarbe: weiß / W

Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5

Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8

Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5

Laub - Festigkeit: durchschnittlich / 6,5

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5

Schalenqualität: gut / 7

Knollenform: ovallang / OL

Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7

Knollenansatz: durchschnittlich / 6

Knollengröße: groß / 8

Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7

Keimruhe: relativ kurz / 5,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5

Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8

Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5

Ernteschäden: relativ empfindlich / 6

Ethylen: - / -

Unterwassergewicht: 332

Trockenmassegehalt: 18,3%

Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB

Grauverfärbung (nach dem Kochen): - / -

Rohverfärbung: - / -

Pommes-frites-Qualität: - / -

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: - / -

Gehalt an Glykoalkaloiden: 15

ANBAUEMPFEHLUNG



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.

Pflanzabstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Keine Verwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang, da sich eine starke Laubreaktion und eine starke Ertragsverringerng ergeben können.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6,5

Krautfäule: sehr anfällig / 3,5

Knollenfäule: etwas anfällig / 6

Fusarium: - / -

Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: - / -

Schwarze Flecken: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent* / 10*

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: anfällig* / 1*

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -