

Oregon (AR 14-3578).



Verarbeitung
Chips

Eine gleichmäßige
Haupternte-Chips-Sorte mit guter der
Knollenform und -größe und hohem
Trockenmassegehalt.

- ▶ **Gleichmäßige Form und Größe**
- ▶ **Gute Chipsqualität, auch nach
Langzeitlagerung**
- ▶ **Wenige Knollenfehler**



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: LEANDRA x VR 808
Züchterrecht: Bevorstehend
Setzling: AR 14-3578

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: helllila / LP
Anzahl Beeren: - / -
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: ovalrund / OR
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 465
Trockenmassegehalt: 24,9%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): empfindlich / 5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6,5
Pommes-frites-Qualität: überdurchschnittlich / 6,5
Trockenmasseverteilung: relativ schlecht / 5
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

ANBAUEMPFEHLUNG



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Knollen vorzugsweise in angewärmten Boden pflanzen, da die Entwicklung bei dieser Sorte anfangs langsam verläuft.

Pflanzabstand

30/50 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringering ergeben.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 9 °C. Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Yntn (Knolle): - / -

Pfropfenbildung: anfällig / 5

Krautfäule: sehr anfällig / 4,5

Knollenfäule: anfällig / 5

Fusarium: - / -

Schorf: etwas anfällig / 6,5

Pulverschorf: - / -

Schwarze Flecken: - / -

Warzenkrankheit F1: sehr anfällig* / 1*

Warzenkrankheit F6: sehr anfällig* / 1*

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -