ANBAUEMPFEHLUNG

Feliz (SW 14-7008).

Eine zweitfrühe Salat-Kartoffelsorte mit oval-langen Knollen, Kochtyp A und starker PVY-Resistenz.

Einzelhandel
Salatsorten

- **Gute Schalenoptik**
- **Kochtyp A**
- **Gute PVY-Resistenz**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.
Kreuzung: LORELEY x SW 06-0296
Züchterrecht: Bevorstehend
Setzling: SW 14-7008

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: - / -
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: viele / 8
Knollengröße: durchschnittlich / 6,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: relativ kurz / 5,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 358
Trockenmassegehalt: 19,6%
Kochtyp: festkochend / A
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4
Pommes-frites-Qualität: - / -
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

30/50 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 7
Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 8
Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4
Krautfäule: sehr anfällig / 3,5
Knollenfäule: anfällig / 5,5
Fusarium: - / -
Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: - / -
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent* / 10*
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: anfällig* / 4*
Weiße Nematoden Pa 2: moderat anfällig* / 5*
Weiße Nematoden Pa 3: anfällig* / 3*

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de