

Feliz (SW 14-7008).



Einzelhandel
Salatsorten

Eine zweitfrühe Salatsorte mit oval-langen Knollen, Kochtyp A und starker PVY-Resistenz.

- » **Gute Schalenoptik**
- » **Kochtyp A**
- » **Gute PVY-Resistenz**



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.

Kreuzung: LORELEY x SW 06-0296

Züchterrecht: Bevorstehend

Setzling: SW 14-7008

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7

Lichtkeim: - / -

Blütenfarbe: weiß / W

Anzahl Beeren: - / -

Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8

Laub - Entwicklung Ende: gut / 8

Laub - Festigkeit: relativ fest / 7

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5

Schalenqualität: gut / 7

Knollenform: ovallang / OL

Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5

Knollenansatz: viele / 8

Knollengröße: durchschnittlich / 6,5

Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5

Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6

Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8

Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7

Ernteschäden: leicht bis nicht empfindlich / 8

Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6

Unterwassergewicht: 358

Trockenmassegehalt: 19,6%

Kochtyp: festkochend / A

Grauverfärbung (nach dem Kochen): - / -

Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4

Pommes-frites-Qualität: - / -

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: - / -

Gehalt an Glykoalkaloiden: -

ANBAUEMPFEHLUNG



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

30/50 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringering ergeben.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: etwas anfällig / 7

Virus - Yntn (Knolle): - / -

Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4

Krautfäule: sehr anfällig / 3,5

Knollenfäule: anfällig / 5,5

Fusarium: - / -

Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: - / -

Schwarze Flecken: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent* / 10*

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: anfällig* / 4*

Weißer Nematoden Pa 2: moderat anfällig* / 5*

Weißer Nematoden Pa 3: anfällig* / 3*