ANBAUEMPFEHLUNG

Texas (AR 14-3488).

Eine ertragreiche Haupternte-Verarbeitungs-Kartoffelsorte für die Pommes-frites-Industrie, welche für verschiedene Bodentypen geeignet ist.

Verarbeitung
Pommes frites

- **Hoher Ertrag**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Mehrfache Resistenz gegen Kartoffelkrebs**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: LEANDRA x AR 07-4113
Züchterrecht: Bevorstehend
Setzling: AR 14-3488

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 427
Trockenmassegehalt: 23%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): empfindlich / 5,5
Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4,5
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6
Pfropfenbildung: anfällig / 5
Krautfäule: sehr anfällig / 4
Knollenfäule: anfällig / 5,5
Fusarium: - / -
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: - / -
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: resistent* / 10*
Warzenkrankheit F18: resistent / 10
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de