

Texas (AR 14-3488).



Verarbeitung
Pommes frites

Eine ertragreiche Haupternte
Verarbeitungssorte für die
Pommes-frites-Industrie, welche für
verschiedene Bodentypen geeignet ist.

- ▶ **Hoher Ertrag**
- ▶ **Hoher Trockenmassegehalt**
- ▶ **Mehrfache Resistenz gegen Kartoffelkrebs**

Picture not yet available



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: LEANDRA x AR 07-4113
Züchterrecht: Bevorstehend
Setzling: AR 14-3488

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 427
Trockenmassegehalt: 23%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7,5
Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4,5
Pommes-frites-Qualität: gut / 7
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

ANBAUEMPFEHLUNG



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung. Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.

Pflanzabstand

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Picture not yet available

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5

Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6

Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4,5

Krautfäule: sehr anfällig / 4

Knollenfäule: anfällig / 5,5

Fusarium: - / -

Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: - / -

Schwarze Flecken: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: resistent* / 10*

Warzenkrankheit F18: resistent / 10

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -