

Saprodi.



Verarbeitung
Stärke

Image:

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Kreuzung: SCARLET x SOFISTA

Züchterrecht: 31-12-2044

Setzling: SL 04-454

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4

Blütenfarbe: weiß / W

Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7

Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: hellgelb / 6

Schalenqualität: sehr schlecht / 4

Knollenform: ovalrund / OR

Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7

Knollenansatz: relativ viele / 7

Knollengröße: relativ groß / 7,5

Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6

Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: empfindlich / 5,5

Schwarzfleckigkeit: sehr empfindlich / 4,5

Wachstumsrisse: - / -

Ernteschäden: relativ empfindlich / 6,5

Unterwassergewicht: 554

Trockenmassegehalt: 29,3%

Kochtyp: mehlig / C

Grauverfärbung (nach dem Kochen): empfindlich / 5,5

Rohverfärbung: - / -

Pommes-frites-Qualität: sehr gut / 7,5

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: durchschnittlich / 6

Gehalt an Glykoalkaloiden: 6,4 mg/100g

S_Harvestability: - / -



Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz. Es kann organischer Dünger verwendet werden.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 6 °C. Geeignet für kurze bis mittelfristige Lagerung.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 7

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (Knolle): - / -

Pfropfenbildung: anfällig / 5

Krautfäule: anfällig / 5

Knollenfäule: etwas anfällig / 7

Fusarium: etwas anfällig / 6

Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: etwas anfällig / 7

Schwarze Flecken: - / -

R_PCN Tolerance: kaum bis nicht anfällig / 8

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: resistent / 10

Warzenkrankheit F18: resistent / 10

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: resistent / 9

Weiße Nematoden Pa 2: resistent / 9

Weiße Nematoden Pa 3: resistent / 9