

Supporter.



Verarbeitung
Stärke

Image:

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Kreuzung: SOFISTA x FESTIEN

Züchterrecht: 31-12-2042

Setzling: SL 02-572

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4

Blütenfarbe: weiß / W

Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6

Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5

Laub - Entwicklung Ende: schlecht / 6

Laub - Festigkeit: fest / 8

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: weiß / 4

Schalenqualität: relativ schlecht / 5

Knollenform: ovalrund / OR

Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5

Knollenansatz: relativ wenige / 5,5

Knollengröße: relativ groß / 7,5

Größenregelmäßigkeit: unregelmäßig / 4,5

Keimruhe: relativ lang / 7

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7

Schwarzfleckigkeit: sehr empfindlich / 4

Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7

Ernteschäden: - / -

Unterwassergewicht: 564

Trockenmassegehalt: 29,7%

Kochtyp: mehlig / C

Grauverfärbung (nach dem Kochen): sehr empfindlich / 4,5

Rohverfärbung: - / -

Pommes-frites-Qualität: gut / 7

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: durchschnittlich / 6

Gehalt an Glykoalkaloiden: 7,7 mg/100g

S_Harvestability: empfindlich / 5,5

Anbauempfehlungen



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung. Es kann organischer Dünger verwendet werden.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 6 °C. Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 7

Virus - Yn: - / -

Virus - Yntn (Knolle): - / -

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6

Krautfäule: etwas anfällig / 6,5

Knollenfäule: etwas anfällig / 6,5

Fusarium: - / -

Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: anfällig / 5

Schwarze Flecken: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: moderat anfällig / 8

Warzenkrankheit F18: etwas anfällig / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: resistent / 9

Weiße Nematoden Pa 2: resistent / 9

Weiße Nematoden Pa 3: resistent / 9