

Agria.

Späte, gelbfleischige
Haupternte-Kartoffel-Sorte mit guten
Erträgen und sehr konstanter
Qualität.



Biologisch



Verarbeitung

Pommes frites
Chips
Fertigprodukten



Einzelhandel

Frisch



Konventionell

- ▶ **Hervorragende Backqualität**
- ▶ **Mehrfache Virusresistenzen**
- ▶ **Gute Lagereigenschaften**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Böhm
Kreuzung: QUARTA x SEMLO
Züchterrecht: Abgelaufen
Setzling: BM 77-0945

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: keine / 8
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ wenige / 5
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: lang / 8

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 402
Trockenmassegehalt: 21,8%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: leicht empfindlich / 7
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: 2,7 mg/100g

Anbauempfehlungen



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung. Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringering ergeben.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6

Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 7

Krautfäule: anfällig / 5,5

Knollenfäule: etwas anfällig / 7

Fusarium: etwas anfällig / 6,5

Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 3

Schwarze Flecken: - / -

Warzenkrankheit F1: etwas anfällig / 9

Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 6

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: anfällig / 2

Weißer Nematoden Pa 3: anfällig / 2