ANBAUEMPFEHLUNG

Arizona.

Mittelfrühe Kartoffel-Speisesorte, die bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen hohe Erträge produziert.

Konventionell



- **Frühe, hohe Erträge**
- **Gute Trockenheits- und Hitzetoleranz**
- **Hohe Virusresistenz**
- **Wächst in jedem Klima**

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Züchterrecht: 31-12-2040
Setzling: AR 98-0313

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: durchschnittlich / 6
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: überdurchschnittlich / 6,5
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7,5
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: leicht empfindlich / 7
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 301
Trockenmassegehalt: 17%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 4,2 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C.
Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8
Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 8
Pfropfenbildung: anfällig / 5
Krautfäule: sehr anfällig / 4
Knollenfäule: anfällig / 5
Fusarium: etwas anfällig / 6
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 2
Schwarze Flecken: sehr anfällig / 4
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 6
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de