ANBAUEMPFEHLUNG

Chateau.

Frühe Kartoffel-Salatsorte mit gutem Knollenansatz und relativ gutem Trockenmassegehalt.

Einzelhandel
Salatsorten

- **Hervorragende Schalenqualität**
- **Offizielle Registrierung als festkochend**
- **Hoher Knollenansatz**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: MA 98-0322 x AR 98-0341
Züchterrecht: 31-12-2046
Setzling: AR 05-1443

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: früh / 7,5
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: langoval / LO
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: viele / 8
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 350
Trockenmassegehalt: 19,2%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7,5
Rohverfärbung: leicht empfindlich / 7,5
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 4,2 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 20%.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

30/40 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)
40/50 mm: 26 cm (51.500 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 7
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6,5
Pfropfenbildung: anfällig / 5
Krautfäule: sehr anfällig / 4
Knollenfäule: anfällig / 5,5
Fusarium: etwas anfällig / 7
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 2
Schwarze Flecken: sehr anfällig / 4,5
Warzenkrankheit F1: moderat anfällig / 8
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de