ANBAUEMPFEHLUNG

Corsica.

Eine mittelspäte Kartoffel-Sorte mit guten Chipsqualitäten, hohem Ertrag und hohem Stärkegehalt.

- **Gute Chipsqualität**
- **Gute Lagerfähigkeit**
- **Gleichmäßige Knollengröße**

Verarbeitung
Chips



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: LADY CLAIR x ARG 96-0865
Züchterrecht: 31-12-2046
Setzling: AR 05-1887

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: rundoval / RO
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: relativ lang / 7

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 441
Trockenmassegehalt: 23,7%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6
Rohverfärbung: empfindlich / 5
Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: hervorragend / 8
Gehalt an Glykoalkaloiden: 5,33 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Für Verarbeitungszwecke nicht unter 9 ºC lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6
Virus - Yntn (Knolle): anfällig / 5,5
Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4
Krautfäule: anfällig / 5,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 6,5
Fusarium: etwas anfällig / 7
Schorf: etwas anfällig / 7

Pulverschorf: sehr anfällig / 4,5
Schwarze Flecken: anfällig / 5,5
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de