ANBAUEMPFEHLUNG

Diamant.

Vielseitige mittelspäte Kartoffel-Sorte mit guter Hitzetoleranz und hohen Erträgen, für die Pommes-frites-Zubereitung zu Hause.

- **Hervorragende Backqualität**
- **Gute Virusresistenzen**
- **Für zweite Kultur geeignet**

Konventionell



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Precardi
Kreuzung: CARDINAL MUTANT
Züchterrecht: Abgelaufen
Setzling: -

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 6
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: fest / 8
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6
Keimruhe: relativ kurz / 5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Schwarzfleckigkeit: empfindlich / 5
Wachstumsrisse: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 420
Trockenmassegehalt: 23%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): sehr empfindlich / 4
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: gut / 7
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: durchschnittlich / 6
Gehalt an Glykoalkaloiden: 12,9 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 5%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 20%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6
Virus - Yn: etwas anfällig / 7
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: etwas anfällig / 6
Knollenfäule: etwas anfällig / 7
Fusarium: anfällig / 5
Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 3
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 6
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de