ANBAUEMPFEHLUNG


# Ditta.

Vielseitige mittelspäte Kartoffel-Speise- und Salatsorte, geeignet für den konventionellen und biologischen Anbau.

**Biologisch**

**Einzelhandel**
Frisch
Salatsorten

- **Hervorragende Konsumeigenschaften**
- **Gute Lagereigenschaften**
- **Mehrfache Resistenzen**



# Eigenschaften

## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
**Kreuzung:** BINTJE x QUARTA
**Züchterrecht:** Abgelaufen
**Setzling:** SW 80-0540

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelspät / 6
**Lichtkeim:** blau-violett / BV
**Blütenfarbe:** weiß / W
**Anzahl Beeren:** sehr viele / 4
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7,5
**Laub - Entwicklung Ende:** gut / 8
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7
**Schalenfarbe:** gelb / Y
**Fleischfarbe:** hellgelb / 6,5
**Schalenqualität:** gut / 7
**Knollenform:** langoval / LO
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** regelmäßig / 7
**Knollenansatz:** relativ viele / 7
**Knollengröße:** relativ groß / 7
**Größenregelmäßigkeit:** relativ regelmäßig / 6,5
**Keimruhe:** relativ lang / 7

## Empfindlichkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6
**Schwarzfleckigkeit:** leicht empfindlich / 7
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6,5
**Ernteschäden:** empfindlich / 5,5
**Ethylen:** - / -
**Unterwassergewicht:** 369
**Trockenmassegehalt:** 20,2%
**Kochtyp:** festkochend / A
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** relativ empfindlich / 6
**Rohverfärbung:** sehr empfindlich / 4
**Pommes-frites-Qualität:** unterdurchschnittlich / 5,5
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** ungeeignet / 4
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** -

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

# Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

## Düngung [1]

**Stickstoff:** Standardempfehlung - 10%.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

## Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

## Pflanzabstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

## Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

## Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

## Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** etwas anfällig / 7
**Virus - Yn:** etwas anfällig / 7,5
**Virus - Yntn (Knolle):** anfällig / 5
**Pfropfenbildung:** anfällig / 5
**Krautfäule:** anfällig / 5,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Fusarium:** etwas anfällig / 6
**Schorf:** etwas anfällig / 6

**Pulverschorf:** etwas anfällig / 6,5
**Schwarze Flecken:** etwas anfällig / 6
**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** resistent / 9
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de