ANBAUEMPFEHLUNG

# Esmee.

Mittelfrühe Kartoffel-Speisesorte mit attraktiver roter Schale, guter Hitzetoleranz und gutem Ertrag.

**Einzelhandel**
Frisch

**Konventionell**

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Große Knollen**
- **Mehrfache Virusresistenzen**



# Eigenschaften

## Allgemeine Eigenschaften

**Züchter:** Agrico Research B.V.
**Kreuzung:** LAURA x RODEO
**Züchterrecht:** 31-12-2043
**Setzling:** AR 01-0410

## Kraut- und Knolleneigenschaften

**Reifegruppe:** mittelfrüh / 6,5
**Lichtkeim:** rot-violett / RV
**Blütenfarbe:** helllila / LP
**Anzahl Beeren:** sehr viele / 4
**Laub - Entwicklung Anfang:** relativ schnell / 7
**Laub - Entwicklung Ende:** relativ gut / 7,5
**Laub - Festigkeit:** relativ fest / 7
**Schalenfarbe:** rot / R
**Fleischfarbe:** gelb / 7
**Schalenqualität:** hervorragend / 8
**Knollenform:** ovallang / OL
**Regelmäßigkeit der Knollenform:** relativ regelmäßig / 6,5
**Knollenansatz:** durchschnittlich / 6
**Knollengröße:** groß / 8
**Größenregelmäßigkeit:** regelmäßig / 7
**Keimruhe:** durchschnittlich / 6

## Empfindlichkeit und Qualität

**Durchwuchs:** relativ empfindlich / 6,5
**Schwarzfleckigkeit:** leicht bis nicht empfindlich / 8
**Wachstumsrisse:** relativ empfindlich / 6
**Ernteschäden:** relativ empfindlich / 6,5
**Ethylen:** 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5
**Unterwassergewicht:** 326
**Trockenmassegehalt:** 18%
**Kochtyp:** vorwiegend festkochend / AB
**Grauverfärbung (nach dem Kochen):** empfindlich / 5,5
**Rohverfärbung:** relativ empfindlich / 6
**Pommes-frites-Qualität:** durchschnittlich / 6
**Trockenmasseverteilung:** - / -
**Chipsqualität:** ungeeignet / 4
**Gehalt an Glykoalkaloiden:** 8,2 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

# Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

## Düngung [1]

**Stickstoff:** Standardempfehlung + 10%.
**Phosphat:** Standardempfehlung.
**Potassium:** Standardempfehlung.

## Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

## Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

## Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

## Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

## Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

## Resistenzen

**Virus - Blattrollen:** - / -
**Virus - Yn:** kaum bis nicht anfällig / 8
**Virus - Yntn (Knolle):** etwas anfällig / 7
**Pfropfenbildung:** sehr anfällig / 4
**Krautfäule:** sehr anfällig / 4,5
**Knollenfäule:** etwas anfällig / 7
**Fusarium:** etwas anfällig / 7
**Schorf:** etwas anfällig / 6
**Pulverschorf:** etwas anfällig / 6,5
**Schwarze Flecken:** anfällig / 5,5
**Warzenkrankheit F1:** resistent / 10
**Warzenkrankheit F6:** - / -
**Warzenkrankheit F18:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4:** - / -
**Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 2:** - / -
**Weiße Nematoden Pa 3:** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de