ANBAUEMPFEHLUNG

Thalia.

Mittelspäte Speisesorte mit gelbem Fleisch, Resistenz gegen Kartoffelnematoden und einer guten Keimruhe.

- **Attraktive gelbe Fleischfarbe**
- **Festkochend**
- **Guter Trockenmassegehalt**

Einzelhandel
Frisch



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.
Kreuzung: BELANA x AR 01-3576
Züchterrecht: 31-12-2051
Setzling: SW 10-8218

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: rot / R
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: überdurchschnittlich / 6,5
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: lang / 8

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 385
Trockenmassegehalt: 21%
Kochtyp: festkochend / A
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6,5
Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 3,3 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 15%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 15%.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: anfällig / 5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6,5
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7,5
Fusarium: kaum bis nicht anfällig / 8
Schorf: etwas anfällig / 6

Pulverschorf: - / -
Schwarze Flecken: sehr anfällig / 3,5
Warzenkrankheit F1: sehr anfällig / 1
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: anfällig / 3
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: anfällig / 2
Weiße Nematoden Pa 2: teilweise resistent / 8
Weiße Nematoden Pa 3: teilweise resistent / 7

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de