


Evolution.



Konventionell

Mittelfrühe Kartoffel-Speisesorte mit attraktiver dunkelroter Schale und frühem, gutem Ertrag.

- ▶ **Einheitliche Sortierung**
- ▶ **Große Knollen**
- ▶ **Frühe Ernte**
- ▶ **Gute Schorfresistenz**
- ▶ **Robustes Kraut**



characteristics

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
 Kreuzung: AR 94-0807 x AMOROSA
 Züchterrecht: 31-12-2042
 Setzling: AR 99-0522

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 6,5
 Lichtkeim: grün-rot / GR
 Blütenfarbe: helllila / LP
 Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5
 Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
 Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
 Laub - Festigkeit: durchschnittlich / 6,5
 Schalenfarbe: rot / R
 Fleischfarbe: hellgelb / 6
 Schalenqualität: gut / 7
 Knollenform: ovallang / OL
 Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
 Knollenansatz: relativ viele / 7
 Knollengröße: groß / 8
 Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
 Keimruhe: kurz / 4

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
 Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
 Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
 Ernteschäden: leicht empfindlich / 7
 Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
 Unterwassergewicht: 343
 Trockenmassegehalt: 18,9%
 Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
 Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6
 Rohverfärbung: - / -
 Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4,5
 Trockenmasseverteilung: - / -
 Chipsqualität: ungeeignet / 4
 Gehalt an Glykoalkaloiden: 8

How to grow



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringeringung ergeben.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: anfällig / 5,5

Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7

Pfropfenbildung: anfällig / 5

Krautfäule: sehr anfällig / 4

Knollenfäule: etwas anfällig / 6

Fusarium: etwas anfällig / 6

Schorf: etwas anfällig / 6

Pulverschorf: etwas anfällig / 6,5

Schwarze Flecken: etwas anfällig / 6

Warzenkrankheit F1: moderat anfällig / 8

Warzenkrankheit F6: resistent / 10

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: moderat anfällig / 6

Weißer Nematoden Pa 2: teilweise resistent / 7

Weißer Nematoden Pa 3: moderat anfällig / 5