ANBAUEMPFEHLUNG

Jacky.

Mittelfrühe kleine Kartoffel-Speisesorte mit hohem Ertrag und Widerstandsfähigkeit gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Vorwiegend mehlig kochend**
- **Hoher Knollenansatz**
- **Gute Toleranz gegen Flecken und Schäden**

Biologisch **Verarbeitung** Fertigprodukten **Einzelhandel** Drillinge



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.
Kreuzung: ANOUK x ATHLETE
Züchterrecht: 31-12-2049
Setzling: SW 09-0557

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 6,5
Lichtkeim: grün-rot / GR
Blütenfarbe: helllila / LP
Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: überdurchschnittlich / 6,5
Knollenform: rundoval / RO
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: viele / 9
Knollengröße: durchschnittlich / 6,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6
Keimruhe: relativ kurz / 5,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 368
Trockenmassegehalt: 20,1%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Trockenmasseverteilung: gut / 7
Chipsqualität: ungeeignet / 5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 14,05 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: sehr anfällig / 4,5
Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 8
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Fusarium: anfällig / 5,5
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 2
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 6
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de