

Kuras.

Späte Sorte für den Anbau zur Stärkeproduktion, resistent gegen Kartoffelnematoden und mit sehr gutem Stärkegehalt.



Verarbeitung
Stärke

Image:

- ▶ **Weißer Fleischfarbe**
- ▶ **Gute Lagereigenschaften**
- ▶ **Gute Resistenzen gegen Viren und Kraut- und Knollenfäule**

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: G. Kuper

Kreuzung: PG 285 x AR 69-0491

Züchterrecht: Abgelaufen

Setzling: KU 80-1271

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4

Lichtkeim: blau-violett / BV

Blütenfarbe: weiß / W

Anzahl Beeren: sehr viele / 4

Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7

Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5

Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: weiß / 4,5

Schalenqualität: relativ schlecht / 5

Knollenform: rundoval / RO

Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6

Knollenansatz: durchschnittlich / 6

Knollengröße: relativ groß / 7,5

Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7

Keimruhe: relativ kurz / 5,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6

Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6

Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7

Ernteschäden: empfindlich / 5,5

Ethylen: - / -

Unterwassergewicht: 490

Trockenmassegehalt: 25,9%

Kochtyp: mehlig / C

Grauverfärbung (nach dem Kochen): sehr empfindlich / 4,5

Rohverfärbung: - / -

Pommes-frites-Qualität: unterdurchschnittlich / 5,5

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: ungeeignet / 4,5

Gehalt an Glykoalkaloiden: 33,8 mg/100g

S_Harvestability: - / -

Anbauempfehlungen



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung + 5%. Es kann organischer Dünger verwendet werden.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 7

Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8

Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 9

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6,5

Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 8

Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 8

Fusarium: etwas anfällig / 7

Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: etwas anfällig / 6,5

Schwarze Flecken: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 5

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: resistent / 9

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -