ANBAUEMPFEHLUNG

Manitou.

Späte Kartoffel-Speisesorte mit attraktiver roter Schale und hohem Ertrag.

- **Große Knollen**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Einheitliche Knollengröße**

Einzelhandel
Frisch

Konventionell



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kreuzung: LAURA x MARANCA
Züchterrecht: 31-12-2037
Setzling: MA 96-0419

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: rot / R
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: langoval / LO
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: relativ kurz / 5,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Ernteschäden: empfindlich / 5,5
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 351
Trockenmassegehalt: 19,4%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4,5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 3,4 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 7
Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: etwas anfällig / 6
Fusarium: etwas anfällig / 7
Schorf: etwas anfällig / 6
Pulverschorf: etwas anfällig / 6
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 7
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: resistent / 9
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de