ANBAUEMPFEHLUNG

Markies.

Späte Kartoffel-Allround-Sorte mit hohem Ertrag für Pommes frites, Chips, Fast Food (Systemgastronomie) und den frischen Verzehr.

- **Hervorragende Backqualität**
- **Guter Trockenmassegehalt**
- **Gute Lagereigenschaften**

Verarbeitung
Pommes frites
Chips

Konventionell



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kreuzung: FIANNA x AGRIA
Züchterrecht: 31-12-2029
Setzling: MA 85-0698

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: fest / 8
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 427
Trockenmassegehalt: 22,8%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6
Rohverfärbung: leicht empfindlich / 7
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: gut / 7,5
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: 3,4 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 7
Virus - Yn: etwas anfällig / 7,5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4
Krautfäule: etwas anfällig / 6,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7
Fusarium: kaum bis nicht anfällig / 8
Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: sehr anfällig / 3,5
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 5
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de