ANBAUEMPFEHLUNG

Markies.

Verarbeitung
Pommes frites
Chips

Konventionell

Späte Allround-Sorte mit hohem Ertrag für Pommes frites, Chips, Fast Food (Systemgastronomie) und den frischen Verzehr.

- **Große Knollen**
- **Mehrfache Virusresistenzen**
- **Gute Lagereigenschaften**

characteristics

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kreuzung: FIANNA x AGRIA
Züchterrecht: 31-12-2029
Setzling: MA 85-0698

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: fest / 8
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6,5

Empflindlichtkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: empfindlich / 5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7
Metribuzin: leicht empfindlich / 7
Bentazon: relativ empfindlich / 6
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 427
Trockenmassegehalt: 22,8%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6
Rohverfärbung: leicht empfindlich / 7
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: gut / 7,5
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: 3,4

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstelt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

How to grow

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.Anwendung vorzugsweise in drei Runden. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringerung ergeben.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 ºC. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 ºC lagern. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 7
Virus - Yn: etwas anfällig / 7,5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4
Krautfäule: etwas anfällig / 6,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7
Fusarium: kaum bis nicht anfällig / 8
Schorf: anfällig / 5
Pulverschorf: sehr anfällig / 3,5
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 5
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de