

Nofy.

Späte Stärkesorte mit gutem Ertrag und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.



Biologisch



Verarbeitung
Stärke

Image:

- ▶ **Hoher Trockenmassegehalt**
- ▶ **Gute Lagereigenschaften**
- ▶ **Gute Virusresistenzen**

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: AKV Langholt

Kreuzung: STAYER x AR 02-3921

Züchterrecht: 31-12-2048

Setzling: PL 08-4007

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5

Lichtkeim: grün-rot / GR

Blütenfarbe: weiß / W

Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 7

Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5

Laub - Entwicklung Ende: gut / 8

Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5

Schalenfarbe: gelb / Y

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5

Schalenqualität: relativ schlecht / 5

Knollenform: ovalrund / OR

Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5

Knollenansatz: relativ viele / 7

Knollengröße: relativ groß / 7,5

Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5

Keimruhe: relativ lang / 7,5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5

Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6

Wachstumsrisse: leicht bis nicht empfindlich / 8

Ernteschäden: relativ empfindlich / 6

Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7

Unterwassergewicht: 471

Trockenmassegehalt: 25,2%

Kochtyp: mehlig / BC

Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5

Rohverfärbung: - / -

Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4

Trockenmasseverteilung: - / -

Chipsqualität: ungeeignet / 4,5

Gehalt an Glykoalkaloiden: 15,37 mg/100g

S_Harvestability: empfindlich / 5,5



Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung + 10%. Es kann organischer Dünger verwendet werden.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 Pflanzen/ha)

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5

Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 9

Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4,5

Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 9

Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 8,5

Fusarium: - / -

Schorf: etwas anfällig / 6

Pulverschorf: sehr anfällig / 4,5

Schwarze Flecken: kaum bis nicht anfällig / 8

R_PCN Tolerance: - / -

Warzenkrankheit F1: - / -

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: moderat anfällig / 6

Weißer Nematoden Pa 2: moderat anfällig / 5

Weißer Nematoden Pa 3: anfällig / 2