ANBAUEMPFEHLUNG

Palace.

Späte Haupternte-Kartoffel-Sorte mit hohem Ertrag für die Pommes-frites-Industrie, geeignet für den Anbau auf unterschiedlichen Bodentypen.

- **Geringer Stickstoffbedarf**
- **Hohe Erträge**
- **Einheitliche Sortierung**
- **Hohe Knollenzahl**
- **Hervorragende Pommes frites-Qualität**

Verarbeitung
Pommes frites
Flocken

Einzelhandel
Frisch

Konventionell



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Züchterrecht: 31-12-2049
Setzling: AR 08-4241

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4,5
Lichtkeim: grün-rot / GR
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: relativ kurz / 5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 430
Trockenmassegehalt: 23,2%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6
Chipsqualität: durchschnittlich / 6
Gehalt an Glykoalkaloiden: 13,1 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 25%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 25%.

Saatgutbehandlung

Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 39 cm (33.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 7,5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6
Pfropfenbildung: anfällig / 5,5
Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: etwas anfällig / 6,5
Fusarium: anfällig / 5,5
Schorf: etwas anfällig / 6
Pulverschorf: etwas anfällig / 7,5
Schwarze Flecken: anfällig / 5
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: anfällig / 2
Weiße Nematoden Pa 3: anfällig / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de