
ANBAUEMPFEHLUNG

Paradiso.

Mittelspäte Kartoffel-Sorte mit groß wachsenden Knollen und hervorragendem Ertrag für den konventionellen Markt.

Konventionell



- **Schönes Aussehen**
- **Hohe Erträge**
- **Robustes Kraut**
- **Kräftiges Wachstum**

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: M. Pot & M. Klaver
Kreuzung: RODEO x VALOR
Züchterrecht: 31-12-2048
Setzling: PK 06-0108

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 6
Lichtkeim: rot / R
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6,5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 329
Trockenmassegehalt: 18,2%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4,5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 4,8 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 35 cm (38.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Image:

Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7,5
Pfropfenbildung: sehr anfällig / 4
Krautfäule: anfällig / 5,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 6,5
Fusarium: anfällig / 5
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: etwas anfällig / 7,5
Schwarze Flecken: anfällig / 5,5
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de