

Spectra.

Mittelfrühe Speisesorte mit hohem Ertrag, sehr regelmäßiger Knollenform und attraktiver glatter Schale.




Einzelhandel
Frisch



Konventionell

- ▶ **Große Knollen**
- ▶ **Guter Knollenansatz**
- ▶ **Einheitliche Knollengröße**



characteristics

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.
Kreuzung: ARIELLE x SOFIA
Züchterrecht: 31-12-2046
Setzling: SW 05-1431

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Festigkeit: durchschnittlich / 6,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: sehr gut / 7,5
Knollenform: ovalrund / OR
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7,5
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: relativ kurz / 5

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6
Metribuzin: leicht empfindlich / 7
Metribuzin: leicht empfindlich / 7,5
Bentazon: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ethylen: 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5
Unterwassergewicht: 324
Trockenmassegehalt: 17,9%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6
Rohverfärbung: sehr empfindlich / 4
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 4,5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 4,7

How to grow



www.agricopotatoes.de

Düngung ¹

Stickstoff: Standardempfehlung.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
 35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)
 Pflanzen Sie Spectra etwas tiefer als andere Sorten, um grüne Knollen zu vermeiden.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang können sich eine Laubreaktion und eine gewisse Ertragsverringering ergeben.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.



Say potato,
say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: etwas anfällig / 6

Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7

Pfropfenbildung: anfällig / 5

Krautfäule: sehr anfällig / 4,5

Knollenfäule: etwas anfällig / 6

Fusarium: anfällig / 5,5

Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: sehr anfällig / 4

Schwarze Flecken: anfällig / 5

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -