ANBAUEMPFEHLUNG

Spunta.

Mittelspäte Kartoffel-Speisesorte mit guter Hitzetoleranz und hohen Erträgen.

Konventionell

- **Große Knollen**
- **Einheitliche Knollengröße**
- **Hoher Trockenmassegehalt**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: J. Oldenburger
Kreuzung: BEA x USDA 96-56
Züchterrecht: Abgelaufen
Setzling: Oldenburger 57-88

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 6
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: unterdurchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: lang / L
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: sehr empfindlich / 4
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 387
Trockenmassegehalt: 21%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6
Virus - Yn: etwas anfällig / 6
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 6
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: anfällig / 5,5
Knollenfäule: anfällig / 5
Fusarium: anfällig / 5,5
Schorf: anfällig / 5

Pulverschorf: anfällig / 5
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: anfällig / 2
Weiße Nematoden Pa 3: anfällig / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de