ANBAUEMPFEHLUNG

Twinner.

Speisesorte mit frühem Ertrag für den konventionellen und biologischen Anbau mit Widerstandsfähigkeit gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Relativ festkochend**

Biologisch **Einzelhandel** Frisch **Konventionell**

characteristics

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: G.W. te Winkel
Kreuzung: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Züchterrecht: 31-12-2046
Setzling: TW 07-0807

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: früh / 7,5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: viele / 4,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: durchschnittlich / 7
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ wenige / 5
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empflindlichtkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6,5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7,5
Metribuzin: empfindlich / 5,5
Bentazon: leicht empfindlich / 7,5
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 359
Trockenmassegehalt: 19,7%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: überdurchschnittlich / 6,5
Trockenmasseverteilung: hervorragend / 8
Chipsqualität: ungeeignet / 5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 7,8

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstelt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

How to grow

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 15%.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Knollen vorzugsweise in angewärmten Boden pflanzen, da die Entwicklung bei dieser Sorte anfangs langsam verläuft.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang können sich eine Laubreaktion und eine gewisse Ertragsverringerung ergeben.

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 ºC. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -

Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5

Virus - Yntn (Knolle): anfällig / 5

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6

Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 8

Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 9

Fusarium: etwas anfällig / 6

Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 4

Schwarze Flecken: etwas anfällig / 6,5

Warzenkrankheit F1: resistent / 10

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weiße Nematoden Pa 2: - / -

Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de