ANBAUEMPFEHLUNG

Twinner.

Kartoffel-Speisesorte mit frühem Ertrag für den konventionellen und biologischen Anbau sowie Widerstandsfähigkeit gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Große Knollen**
- **Ansprechendes Äußeres**
- **Relativ festkochend**

Biologisch **Einzelhandel** **Konventionell**
Frisch



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: G.W. te Winkel
Kreuzung: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Züchterrecht: 31-12-2046
Setzling: TW 07-0807

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: früh / 7,5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: viele / 4,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: durchschnittlich / 7
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ wenige / 5
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6,5
Ethylen: 15% bis 25% mehr Knollen / 7
Unterwassergewicht: 359
Trockenmassegehalt: 19,7%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: überdurchschnittlich / 6,5
Trockenmasseverteilung: hervorragend / 8
Chipsqualität: ungeeignet / 5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 7,8 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 15%.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Knollen vorzugsweise in angewärmten Boden pflanzen, da die Entwicklung bei dieser Sorte anfangs langsam verläuft.

Pflanzabstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: etwas anfällig / 6,5
Virus - Yntn (Knolle): anfällig / 5
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 8
Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Fusarium: etwas anfällig / 6
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 4
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 6,5
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de