ANBAUEMPFEHLUNG

Picasso.

Konventionell

Späte Kartoffel-Speisesorte mit gelber Schale, auffälligen roten Augen und guter Schorfresistenz, geeignet für langfristige Lagerung.



- **Hohe Erträge**
- **Gute Trockenheitstoleranz**
- **Gute Toleranz gegen Flecken und Schäden**

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Duoplant V.O.F.
Kreuzung: CARA x AUSONIA
Züchterrecht: Abgelaufen
Setzling: HB 81-0036

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: durchschnittlich / 6,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb mit roten Augen / Y/R
Fleischfarbe: hellgelb / 6
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: lang / 8

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6,5
Ethylen: 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5
Unterwassergewicht: 381
Trockenmassegehalt: 20,8%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 1,9 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 5%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: anfällig / 5
Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8
Virus - Yntn (Knolle): anfällig / 5
Pfropfenbildung: anfällig / 5
Krautfäule: anfällig / 5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7
Fusarium: etwas anfällig / 7
Schorf: etwas anfällig / 7

Pulverschorf: anfällig / 5
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 5
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de