ANBAUEMPFEHLUNG

Rudolph.

Mittelspäte Kartoffel-Speisesorte mit attraktiver roter Schale, guter Hitzetoleranz und sehr hohem Ertrag.

Konventionell

- **Weiße Fleischfarbe**
- **Große Knollen**
- **Gute Lagereigenschaften**



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: CHIEFTAIN x STIRLING
Züchterrecht: 31-12-2035
Setzling: UK 93-1-2

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: helllila / LP
Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Anfang: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: fest / 8
Schalenfarbe: rot / R
Fleischfarbe: weiß / 4
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: ovalrund / OR
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: relativ wenige / 5
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: relativ lang / 7

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 376
Trockenmassegehalt: 20,5%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: - / -
Pommes-frites-Qualität: überdurchschnittlich / 6,5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Gehalt an Glykoalkaloiden: 5,5 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: anfällig / 5
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 7
Krautfäule: anfällig / 5,5
Knollenfäule: anfällig / 5,5
Fusarium: etwas anfällig / 6
Schorf: anfällig / 5
Pulverschorf: etwas anfällig / 7
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 7
Warzenkrankheit F1: resistent / 10
Warzenkrankheit F6: moderat anfällig / 8
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de