ANBAUEMPFEHLUNG

Sevilla.

Eine Haupternte-Kartoffel-Sorte mit gutem Unterwassergewicht, leckerem Geschmack und Widerstandsfähigkeit gegen Krautfäule.

- **Krautfäuleresistenz**
- **Geringer Stickstoffbedarf**
- **Gute Trockentoleranz**

Biologisch

Verarbeitung
Pommes frites
Chips



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: N. Vos
Kreuzung: AGRIA x DOB 1997-507-015
Züchterrecht: 31-12-2048
Setzling: VOS 2006-001-001

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 4,5
Lichtkeim: - / -
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: - / -
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: oval / O
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: lang / 8

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5,5
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 385
Trockenmassegehalt: 21%
Kochtyp: mehlig / C
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: sehr gut / 7,5
Trockenmasseverteilung: gut / 7
Chipsqualität: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)
35/55 mm: 28 cm (48.000 plants/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) vor oder nach dem Aufgang ergibt sich keine Laubreaktion oder Ertragsverringerung.

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 7 ºC. Geeignet für langfristige Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: - / -
Virus - Yntn (Knolle): - / -
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Knollenfäule: - / -
Fusarium: anfällig / 5
Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: - / -
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de