ANBAUEMPFEHLUNG

Sinora.

Mittelfrühe, leicht anzubauende Kartoffel-Sorte mit hohem Ertrag für eine frühe Ernte, für Pommes frites oder Chips.

- **Frühe Lieferung direkt ab Feld**
- **Hoher Trockenmassegehalt**
- **Gute Virusresistenzen**

Verarbeitung
Pommes frites
Chips



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: J. Schilt
Kreuzung: AGRIA x AM 70-2166
Züchterrecht: 31-12-2027
Setzling: SI 85-0482

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: ovalrund / OR
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: durchschnittlich / 6

Empfindlichkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: sehr empfindlich / 4,5
Ethylen: - / -
Unterwassergewicht: 416
Trockenmassegehalt: 22,6%
Kochtyp: vorwiegend mehlig / B
Grauverfärbung (nach dem Kochen): empfindlich / 5
Rohverfärbung: empfindlich / 5
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: gut / 7
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: 8,2 mg/100g

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAUEMPFEHLUNG

Anbauempfehlungen

www.agricopotatoes.de

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 10%.Von organischem Dünger wird abgeraten.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.Mehr als zwei Mal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 Pflanzen/ha)

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 °C lagern. Geeignet für Auslieferung direkt vom Feld oder für kurze Lagerung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6
Virus - Yn: etwas anfällig / 7
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: sehr anfällig / 4,5
Knollenfäule: anfällig / 5
Fusarium: etwas anfällig / 6
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: anfällig / 5
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: anfällig / 4
Weiße Nematoden Pa 3: anfällig / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Die Niederlände +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.de