

Markies.

Όψιμη, υψηλές αποδόσεις, ιδανική για τηγάνι και βιομηχανική επεξεργασία (προτηγανισμένες, κοπτήρια), μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.

- ▶ **Μεγάλοι ομοιόμορφοι οβάλ-μακρείς κόνδυλοι**
- ▶ **Ανθεκτική στις ιώσεις και στους νηματώδεις Ro 1/4.**
- ▶ **Υψηλή στερεά ουσία, καλή αντοχή στον περονόσπορο**



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Τσιπς



Γενικής
Χρήσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Διασταύρωση: FIANNA x AGRIA

Δικαιώματα δημιουργού: 31-12-2029

Σπορόφυτο: MA 85-0698

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 4

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί / BV

Χρώμα άνθους: λευκό / W

Αριθμός μούρων: κάτω του κανονικού / 6,5

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: συμπαγής / 8

Χρώμα φλοιού: κίτρινο / Y

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Σχήμα κονδύλου: οβάλ μακρύ / OL

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Λήθαργος: μέτριος / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Σκασίματα μεγέθους: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Metribuzin (Sencor) προφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Metribuzin (Sencor) μεταφυτρωτικά: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Βάρος εντός νερού: 427

Στερεά ουσία: 22,8%

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / BC

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: καλή / 7

Οδηγίες καλλιέργειας

Λίπανση ¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία -10%. Κατά προτίμηση σε τρεις εφαρμογές, η δεύτερη λίγο μετά την έναρξη κονδυλοποίησης.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +10%.

Μεταχείριση σπόρου

Το σπάσιμο του κύριου φύτρου και η σωστή προβλάστηση είναι ιδανική μέθοδος. Προαιρετικό σπάσιμο των φύτρων μια φορά.

Αποστάσεις φύτευσης

28/35 mm: 27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 33 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Συγκομιδή

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης -

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μέσο χρόνο αποθήκευσης.



Say potato,
say **Agrico.**

Ανθεκτικότητες

Ίωση - LRV: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Ίωση- Spreng: πολύ ευαίσθητη / 4

Περωνόσπορος φύλλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Περωνόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 7

Φουζάριο: ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5

Σπογγόσπορωση: πολύ ευαίσθητη / 3,5

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: - / -

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: αρκετά ευαίσθητη / 5

Καρκίνωση 18: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -